



CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ INJECTION DE TOXINE BOTULIQUE

Document remis à :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal :

Ville :

INDICATIONS

Le traitement par toxine botulique consiste à injecter de très faibles doses de toxine botulique purifiée directement dans les muscles responsables des rides dites « d'expression ». Elle réduit ainsi leur force de contraction et entraîne un lissage naturel des rides. On obtient une peau apaisée qui rajeunit un visage et adoucit le regard.

RÉSULTATS

L'efficacité apparaît dès la première semaine, atteint son maximum entre 15 jours et un mois et se maintient pendant 4 à 6 mois environ. Le retour à l'état initial est progressif et à partir du 4^{ème} mois à 6^{ème} mois les contractions musculaires reprennent lentement. Une nouvelle séance d'injection de toxine botulique peut alors être proposée. Il est nécessaire de respecter un délai minimum de 3 mois entre chaque séance.

TECHNIQUE

L'injection se fait selon des points précis avec des doses adaptées par rapport à l'examen clinique que réalisera le docteur Christel Barbé, en fonction de la localisation et de la profondeur des rides. L'anesthésie n'est pas nécessaire, les injections sont rarement douloureuses ;

EFFETS INDÉSIRABLES

Des ecchymoses transitoires au points d'injection (rares), un léger gonflement des paupières pendant 24 à 48 heures, de même qu'une sensation transitoire de tension dans la région frontale et palpébrale.

Ptôsis de la paupière supérieure, se manifestant par une ouverture limitée de la paupière. Cet effet est rare, opérateur dépendant ou si le patient se frotte les yeux au décours de l'injection. Il est toujours réversible, sa durée est plus courte que l'effet de la toxine botulique sur les rides et peut durer jusqu'à 4 semaines environ. Un traitement local pourra être prescrit par le docteur Christel Barbé le cas échéant.

Des maux de tête peuvent apparaître, rares et transitoires. La prise de paracétamol est possible.

PRÉCAUTIONS PRÉ-INJECTIONS

Un traitement anticoagulant ou antiagrégant (aspirine par exemple) en cours, nécessite des précautions d'emploi. Tout traitement médical doit être signalé.

PRÉCAUTIONS POST-INJECTIONS

Il faut éviter de s'allonger dans les 4 heures qui suivent l'injection, de mettre la tête en bas, de faire du sport, du sauna, du hammam, de masser les sites d'injection.

CONTRE-INDICATIONS

Les contre indications absolues sont la myasthénie, certaines maladies neuromusculaires, un traitement concomitant avec des aminosides, une allergie à la toxine botulique.

Grossesse, allaitement.

Inflammation ou infection évolutive au point d'injection.

PRODUITS UTILISÉS

Le docteur Christel Barbé choisira en fonction de son examen clinique la toxine botulique la plus adaptée pour le patient.

VISTABEL

AZZALURE

Je soussigné(e),

Certifie que le docteur Christel Barbé m'a exposé tous les risques connus inhérents à ce geste. Je reconnais avoir pu lui poser toutes les questions concernant ce traitement médical et que les explications ont été claires et compréhensives. Je reconnais que le docteur Christel Barbé a pris le temps de tout m'expliquer.

Je reconnais avoir informé le docteur Christel Barbé de mes antécédents médicaux, des interventions, soins et traitements dont j'ai pu bénéficier à ce jour.

Je donne mon consentement libre et éclairé pour pratiquer l'acte mentionné ci-dessus, en toute connaissance de cause.

Fait en double exemplaires originaux

Le :

A :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »)